

RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO VIDEOENDOSCÓPICO DE LA HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO EN LIMA-PERÚ

Autores: Suárez J.H., Ortega L., Gamboa S., Apaza J.L., Arcaya J.
Instituto Nacional De Salud Del Niño
Lima, Perú

Introducción: La video endoscopia tiene múltiples beneficios y su utilización con fines diagnósticos y terapéuticos ha marcado un significativo descenso en la morbilidad de los pacientes pediátricos con patología diafragmática en el Perú. Reportamos los primeros casos de cura quirúrgica por video endoscopia desde mayo del 2007 hasta la fecha, realizadas en el instituto de salud del niño y en el hospital de emergencias pediátricas.

Objetivos: Determinar la incidencia de hernia diafragmática, técnicas quirúrgicas empleadas, morbimortalidad asociada y estancia hospitalaria.

Materiales y Métodos: Se revisaron las historias clínicas de los 9 pacientes operados por video endoscopia durante el período de Mayo del 2007 a Agosto del 2009.

Resultados: El rango de edad fue de 4 días a 11 años de edad, la edad promedio fue de 1 año 8 meses, encontrándose la mayor frecuencia en el sexo femenino, 5 casos (55%), siendo la hernia diafragmática izquierda la más frecuente con 6 casos (66%). se realizo en 8 pacientes video toracosopia para la cura quirúrgica y solo uno se realizo por vía abdominal, el rango de la estancia hospitalaria fue de 4 a 7 días con un promedio de 5, 7 días, la permanencia del dren toracico fluctúo entre 2 a 6 días con un promedio de 3, 3 días, solo un paciente fue reintervenido al año por presentar recidiva, no hubo mortalidad en ninguna de las técnicas empleadas.

Discusiones y Conclusiones: En nuestra experiencia, la cura quirúrgica por medio de videoendoscopia fue un procedimiento con baja morbilidad y sin mortalidad, lo que constituye un procedimiento seguro y efectivo para el tratamiento de la hernia diafragmática congénita.