

RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

Operación de Malone . ¿Mejoría de la continencia ?

Autores: Navarro R., González D., Guisasola A., Ficcardi J.C.
Hospital Humberto Notti
Mendoza, Argentina

Introducción: El uso de conductos cateterizables en tubo digestivo, en pacientes incontinentes y/o constipados graves y rebeldes a otros tratamientos incruentos, es motivo de distintas consideraciones.

Objetivos: Presentar nuestra experiencia en conductos cateterizables continentes de tubo digestivo, con incontinencia y/o constipación que no han respondido a diversos métodos incruentos de tratamiento.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo del análisis de historias clínicas en un período de 10 años (1998-2008). Se presentan 16 casos. 12 pacientes con Incontinencia y 4 con Constipación. Fueron evaluados: Edad, sexo, patología de base, cirugías previas, motivo de la indicación, técnica quirúrgica, complicaciones y evolución. **Resultados:** 10 pacientes con buen resultado, sin manchado ni constipación luego de un período de más de 2 años de seguimiento. 4 de ellos dejaron de usar el conducto. 5 pacientes mejoraron su situación y tienen manchado y/o constipación ocasional. 1 paciente se perdió del control.

Conclusiones: Consideramos que nuestros resultados son buenos y alentadores, siendo la mejor opción frente a una colostomía permanente.

Comentarios: El método aplicado tuvo una gran aceptación y satisfacción de los padres y pacientes. Destacamos que el método sirvió en 4 pacientes para que tomaran conciencia de la importancia de estar "limpios" y lograron controlar su incontinencia abandonando el uso del conducto cateterizable.