

RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

**CARACTERÍSTICAS Clínica S, QUIRÚRGICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA
HITADOSIS HEPÁTICA EN EL INSITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
(INSN). LIMA-PERÚ**

Autores: Suárez J.H., Ocampo E., Apaza J.L., Arcaya J. Tabuchi M.
Instituto Nacional De Salud Del Niño
Lima, Perú

Introducción: La hidatidosis o equinococosis hidatídica es una enfermedad parasitaria perteneciente al grupo de las zoonosis caracterizada por la presencia de quistes que constituyen la fase larvaria de la tenia echinococcus. Su distribución en el mundo es amplia y endémica en varias regiones del mundo especialmente en regiones ganaderas y nuestro país no escapa a esa realidad. El objetivo del presente estudio es presentar la caracterización clínico quirúrgica y epidemiológica de la hidatidosis hepática en niños atendidos en nuestro hospital. Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo y descriptivo que buscó caracterizar clínica y epidemiológicamente una serie de 25 pacientes de 5 a 17 años con lesiones hepáticas quísticas hidatídicas y tratadas quirúrgicamente en el INSN entre Octubre del 2006 y Febrero del 2009.

Resultados: La mayoría de pacientes correspondió al grupo etáreo de Escolares (5-10 años), la afectación fue igual para ambos sexos. Todos los casos tuvieron estudio con ecografía y/o Tomografía. Del total, 80% pacientes tuvieron estudio serológico: 40% solo Wester Blot, 16% tuvo solo Arco V, 30% tuvieron ambos exámenes y 20 % no tuvieron ningún estudio serológico; el cirujano debido a su experiencia ya no consideró necesaria su realización. Además se confirmó el diagnóstico de estos pacientes por una laparoscopia Diagnostica. El 52% (13/25) de pacientes tuvieron quiste único. El lóbulo más afectado fue el derecho 60% (15/25). El 88% (22/25) de casos fueron quistes no complicados. En cuanto al tratamiento quirúrgico el 60% se hicieron por cirugía convencional y el 40% por laparoscopia. El tratamiento de la cavidad se hizo mediante la inyección de sustancia esclerosante, seguida de destechamiento del quiste y extracción de membranas germinativas en el 92% de los casos; en todos los casos se hizo control ecografico post operatorio. La mortalidad de la serie fue del 0%.

Conclusiones: Las características estudiadas no varían mucho de las mostradas en otros estudios, sin embargo, en cuanto al tratamiento quirúrgico se aprecia que se está introduciendo progresivamente la laparoscopia como alternativa Quirúrgica y Diagnostica en nuestro medio.

Palabras clave: Hidatidosis hepática, niños, laparoscopia.