

**RESUMENES XXXVII CONGRESO CHILENO CIRUGIA PEDIATRICA**

**O-35**

**Viernes 19 Nov**

**10:00-10:10**

**HENDIDURA LARINGOTRAQUEOESOFAGICA (HLTE). EXPERIENCIA CLINICA 1999 - 2009, EN EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE 6 PACIENTES.**

Patricio Varela, Cecicila Borel, Oscar Herrera, Virginia Linacre, Constanza Ibañez, Heidy Vasquez.

Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago

---

Pacientes y metodo: seis pacientes diagnosticados y tratados entre los años 1999 y 2009. Cuatro se diagnosticaron en el periodo recién nacido. Los grados de la malformacion fueron 3 HLTE grado IV, 1 HLTE grado III y grado I en 2 pacientes de 1 año de edad. El sintoma principal fue respiratorio con episodios de dificultad respiratoria, estridor y cianosis durante la alimentacion. El diagnostico fue objetivado en todos con laringoscopia optica rigida.

Resultados: 2 pacientes con HLTE grado IV diagnosticados en 1999 fallecieron ( sin cirugia correctora realizada) y el tercero se encuentra traqueostomizado con asistencia ventilatoria luego de 8 meses de la cirugia reparadora. 1 RN con HLTE grado III fue operado con exito y seguimiento a 6 años se encuentra asintomático. 1 paciente con HLTE grado I fue intervenido con exito por via endoscopica con mejoría de los sintomas respiratorios aspirativos.

Conclusiones: La HLTE corresponde a una compleja malformacion traqueoesofagica. La laringoscopia con optica rigida es esencial para confirmar el diagnostico, clasificar la malformacion y definir alternativas terapeuticas.