

LESIONES PERIANALES EN NIÑOS ONCOLÓGICOS SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA

Alberto Miño Barrera, Francisco Saitúa Doren

Hospital Luis Calvo Mackenna

Los niños sometidos a quimioterapia por patologías oncológicas son susceptibles de presentar lesiones perianales, tales como; las fisuras, fístulas, abscesos, celulitis, verrugas, condilomas, las cuales frecuentemente no son pesquisadas oportunamente. El presente trabajo pretende describir las distintas lesiones en esta región y determinar la prevalencia de estas en este grupo de pacientes. Se realizó un estudio de colección retrospectivo de datos desde el año 2006 hasta el 2011, pesquisando los pacientes que presentaron lesiones en la región perianal en el Hospital Luis Calvo Mackenna, siendo excluidos en el estudio los niños que recibieron radioterapia.

Resultados: De un total de 447 niños oncológicos ingresados desde el año 2006 hasta el 2011, se pesquisaron 15 niños con lesiones perianales atribuibles al periodo de inmunosupresión, lo que equivale al 3% de los niños. Siendo las fisuras anales la entidad más frecuente. Dos de ellos con evolución tórpida que requirieron tratamiento quirúrgico. El resto de los pacientes solo requirieron tratamiento médico

Discusión: El manejo multidisciplinario de los niños inmunodeprimidos es vital, para un correcto manejo de las lesiones, tanto como prevenir la aparición de estas. Existe en la actualidad diversos tratamientos dependiendo del tipo de lesión, en el Hospital Calvo Mackenna se encuentra un protocolo de manejo ante estas lesiones. Pero aún falta mejorar el registro de estas patologías como de sus características.