

RESUMENES XLVIII JORNADAS DE INVESTIGACION PEDIATRICA

TRAUMA ABDOMINAL EN MALTRATO INFANTIL

Aldunate M., Díaz, A., Contreras R.,
Hospital Roberto del Río, Chile

El Maltrato infantil es una lamentable realidad que existe en todos los países y se presenta como negligencia y abandono, abuso sexual, violencia psicológica y maltrato físico entre otros. En estos casos de violencia física las lesiones más evidentes son hematomas de partes blandas, quemaduras y traumatismos craneanos, sin embargo hay pacientes que pueden presentar trauma abdominal asociado o en forma exclusiva.

Presentamos dos casos clínicos de niños con abdomen agudo secundarios a violencia física por maltrato y su manejo clínico.

Paciente 1: sexo femenino 4 años 8 meses. Con familia disfuncional, madre con antecedentes de drogadicción. Ingres a al servicio de urgencia con historia brusca de dolor abdominal, vómitos y palidez asociada a distensión abdominal, taquicardia y equimosis periumbilical. Requiere estabilización hemodinámica en UTI y estudio con imágenes que solo muestran edema de asas intestinales y abundante líquido libre. Laparotomía exploradora muestra perforación única de yeyuno a 30 cms del Treitz en segmento desvitalizado y con brecha mesentérica.. Se realiza resección y anastomosis primaria con buena evolución postoperatoria. Por hallazgos se sospecha maltrato y la paciente refiere en forma espontánea golpe de puño por su padrastro en el abdomen. Se realiza denuncia, apoyo psicológico y seguimiento del caso social y judicial.

Paciente 2: sexo masculino 6 años 10 meses. Ingres a urgencia trasladado por la policía y gracias al llamado de vecinos. Ingres a con abdomen agudo y múltiples hematomas visibles, relata agresión de parte de su madre. Se realiza estabilización y laparotomía exploradora encontrando varias equimosis intestinales, zonas en vías de necrosis y perforación apendicular. Se realiza apendicectomía, aseo peritoneal y laparotomía contenida. Requiere posteriormente de múltiples resecciones intestinales, aseo y ostomía ileal logrando control de daños y reconstitución de tránsito 77 días después con buena evolución. Durante su hospitalización se realizó apoyo psicológico y resolución del caso social y judicial.

Conclusión: el trauma abdominal por maltrato infantil debe considerarse dentro de las etiologías del abdomen agudo. Las lesiones provocadas pueden ser de difícil manejo debido a su magnitud y a la consulta tardía.